



# Fendona® 15 sc

Insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare (inclusiv țânțari adulți) și târâtoare, destinat atât utilizatorilor profesionali, cât și utilizatorilor casnici.



## BASF SRL

Șos. Pipera nr. 43, Corp A, Etaj 1  
Sector 2, 014254 - București  
T: 021 529 90 68/ 61 | F: 021 529 90 69  
[www.agro.basf.ro](http://www.agro.basf.ro)

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio daună provocată de folosirea informațiilor din această broșură.

 **BASF**  
We create chemistry

# Fendona® 15 sc



Insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare (inclusiv țânțari adulți) și târătoare, destinat atât utilizatorilor profesionali, cât și utilizatorilor casnici.

**Conține:** 15 g/l alfa-cipermetrin

**Formulare:** suspensie concentrată.



## Mod de acțiune:

Fendona®15 SC combate insectele prin acțiuni de contact și ingestie. Eficacitatea sa deosebită este dată de faptul că substanța activă alfa-cipermetrin, formează particule care se lipesc de corpul gândacilor, furnicilor, puricilor și al altor dăunători. Substanța activă din aceste particule este absorbită prin contact, provocând iritarea insectelor în următoarele 5 minute. În momentul în care insecta încearcă să înlăture aceste particule, vine de fapt în contact cu substanța, urgentând procesul de absorbție. Poate provoca efectul de "șoc" în mai puțin de 30 minute, după care moartea insectelor survine în decurs de 24 ore.



## Spectru de activitate și mod de folosire:

Fendona®15 SC este recomandată pentru combaterea muștelor, gândacilor de bucătărie, țânțarilor, puricilor, ploșnițelor și altor insecte din domeniul igienei publice. Soluția se aplică prin stropire în benzi cu o lățime de 35 cm pentru combaterea gândacilor de bucătărie, pe toată suprafața pentru dezinsecția spațiilor de depozitare, sau se respectă indicațiile tehnice specifice pentru insecta pe care dorim să o combatem. Cu 1 litru de soluție de lucru se pot trata aproximativ 20 metri pătrați. Produsul se aplică prin pulverizare pe suprafețele infestate astfel:

- **Infestare slabă:** 25 ml produs/5 l apă, cu o rată de aplicare de 1 l soluție de lucru/20 mp;

- **Infestare puternică sau tratament inițial:** 150 ml produs/5 l apă, cu o rată de aplicare de 1 l soluție de lucru/20 mp;

- **Tratament de întreținere:** 100 ml produs/5 l apă, cu o rată de aplicare de 1 l soluție/20 mp.



## Combate insecte zburătoare și târătoare:

- Furnici
- Purici
- Muște
- Gândaci



Clienții solicită	Fendona®15 SC oferă:
Rezultate de lungă durată	Substanța activă originală: alfa - cipermetrin
Insecticide care să poată fi utilizate în toate mediile	Spectru larg de combatere al insectelor
Rezultate vizibile rapid	Dispariție rapidă a insectelor dăunătoare
Reducerea riscului reapariției insectelor	Efect rezidual de lungă durată
Rapiditate și siguranță în utilizare	Doză redusă cu impact pozitiv asupra mediului

Formulare de înaltă calitate: soluție concentrată.




- Locuințe;
- Hoteluri;
- Spitale;
- Clădiri municipale;
- Cinematografe;
- Site-uri de producție alimentară, preparare și vânzare cu amănuntul;
- Restaurante;
- Depozite.



## Acțiune rapidă asupra insectelor dăunătoare:

Un produs pentru mai multe aplicații casnice, comerciale și publice de sănătate:



Sursa: Biogenius 2006

Dispariția 100% a insectelor se realizează de obicei în decurs de 30 de minute de la aplicare.