

SOLEIL FUNGICID

Conține: Conține: 167 g/l bromuconazol + 107 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 141PC/16.03.2016

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Soleil se prezintă sub formă de lichid omogen, galben transparent, dispersabil în apă, ce conține 167 g/l bromuconazol și 107 g/l tebuconazol.

AVANTAJE

- Translocare rapidă a produsului în plantă
- Acțiune curativă și protectivă
- Interval de aplicare foarte larg
- Flexibilitate în aplicare

MOD DE ACȚIUNE

Soleil este un amestec de două substanțe active din grupa triazolilor și este un fungicid sistemic cu un nivel ridicat de acțiune curativă și protectivă. **Soleil** este foarte eficient împotriva unui spectru larg de boli foliare și ale spicului la cerealele păioase și reduce nivelul de micotoxine produse de unele dintre aceste boli.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	BOLI	DOZA
Grâu, Secară, Triticale	<i>Septoria nodorum</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia recondite</i> , <i>Fusarium sp.</i> , <i>Erysiphe graminis</i> .	1,2 l/ha

MOMENTUL APLICĂRII

Aplicarea tratamentelor se face la avertizare, ca tratament foliar în timpul vegetației de la apariția celui de al treilea nod și până la formarea boabelor - stadiul de lapte (BBCH 33-71). Se aplică un singur tratament cu **Soleil** pe cultură într-un sezon.

În cazul în care cultura este deja afectată de fâinare la momentul tratamentului, **Soleil** se va aplica în amestec cu un fungicid specific cu efect de eradicare al fâinării.



SOLEIL FUNGICID

Soleil®



TEHNICA DE APLICARE

Tratamentul se va aplica cu echipamente terestre utilizând un volum de soluție cuprins între 200-400 litri/ha. Volumul mare de soluție se va aplica la culturile dense. Echipamentul de aplicare trebuie să fie verificat și calibrat corespunzător înainte de aplicarea tratamentului.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI

Se va umple pe jumătate rezervorul mașinii de stropit cu apă curată. Se agită bine ambalajul ce conține produsul, pentru omogenizare. Se va adăuga cantitatea necesară de produs, se completează cu apă, agitându-se bine până la umplere. Soluția pregătită se va utiliza în totalitate și nu se păstrează în rezervor pentru ziua următoare.

COMPATIBILITATE

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultați lista de compatibilități și efectuați un test.

TIMP DE PAUZĂ

42 de zile de la aplicarea tratamentului.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

După aplicarea tratamentului se vor spăla foarte bine echipamentele utilizate.

PRODUCĂTOR

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Parc d'Affaires de Crécy
2 rue Claude Chappe
FR-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or,
France

DEȚINĂTOR OMOLOGARE / DISTRIBUTOR

Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, București
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

