

## TREK P 334 SE

### Erbicid pentru porumb și sorg

Certificat de omologare nr. 2821/18.12.2008

Substanțe active: Pendimetalin 64 g/l + Terbutilazin 270 g/l

Formulare: SE (Suspoemulsie)

Clasificare: Xi (Iritant); N(Periculos pentru mediu)

| Cultura | Agenți de dăunare  | Doza   |
|---------|--|--|
| Porumb  | Buruieni dicotiledonate anuale (excepție <i>Xanthium, Sinapis</i> )                                      | 2,5 – 3,5 l/ha asociat cu un graminicid (doza se aplică diferențiat în funcție de tipul de sol), preemergent                                       |
|         | Buruieni dicotiledonate anuale (inclusiv <i>Xanthium, Solanum, Sinapis</i> )                             | 2,0 – 2,5 l/ha postemergent timpuriu, singur sau asociat cu un erbicid anticostreic (doza se aplică diferențiat în funcție de gradul de infestare) |
| Sorg    | Buruieni dicotiledonate anuale (excepție <i>Raphanus, Xanthium, Solanum, Abutilon, Cirsium, Rubus</i> )  | 3,5 l/ha (preemergent)   |
|         | Buruieni dicotiledonate anuale (inclusiv cele rezistente: <i>Xanthium, Solanum, Raphanus, Abutilon</i> ) | 2,0 – 2,5 l/ha (postemergent timpuriu, sorg înfrățit, buruieni 2-4 frunze)   |

### MOD DE ACȚIUNE

**TREK P 334 SE** conține substanța activă **pendimetalin**, care acționează asupra gramineelor, începând din faza de germinare și până în primele faze de la răsărire.

Produsul conține ca substanță activă și **terbutilazin**, care acționează prin inhibarea fotosintezei în postemergență pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. În decurs de 7 – 10 zile are loc distrugerea totală a buruienilor.

### RECOMANDĂRI DE APLICARE

**TREK P 334 SE** se aplică preemergent, asociat cu un graminicid pelicular; la tratamentele postemergente se aplică cu un graminicid în cazul infestărilor puternice cu buruieni graminee sau cu un erbicid pe bază de 2,4 D în cazul infestărilor cu specii de *Cirsium*.

La sorg se poate aplica pre și postemergent, dar fără a se asocia cu un graminicid.